POMO D'ADAMO CEDRATO

CITRUS MEDICA POMUM ADAMI CITRATUM

Citrus seu Pomum Adami citratum, fructu magno ovato acuminato, cortice maxime scabro, papilloso, crasso. Medulla subfibrosa, succo acido minime abundante, dissepimentis octo ad decem sinistrorsum et destrorsum rotatis. Nobis.

Il Pomo d'Adamo cedrato è una specie di Agrume, di pianta piuttosto piccola, giacchè non oltrepassa l'altezza di tre piedi in circa, con tronco grosso legnoso, e con rami robusti tozzi, e disposti molto irregolarmente, cosicchè non ha mai un bell'aspetto, nè una forma piacevole all'occhio. Le foglie sono coriacee robuste grandi, di punta ottusa e crespute, di un colore verde carico, e persistenti.

I rami quando passano l'anno, si trovano guerniti all'ascella delle foglie di una spina corta resistente, e molto più sottile di quella che si trova sui Cedri.

Sebbene questo agrume continovi a fiorire fino a Settembre, nondimeno il vero tempo della fioritura capace di dare i migliori frutti, è nel Maggio. Questi fiori aggruppati, grossi, corti, esternamente rossi, allegano per lo più nel Giugno.

I frutti maturano l'anno dopo nell'Agosto, nel qual tempo si possono cogliere per serbarli in luoghi asciutti e rinvoltati nella carta sugante o fra i trucioli di carta, o in altro modo come si fa dei *Limoni di Giardino.*

Questi frutti sono pochi sopra ciascuna pianta, ed è bene lasciarveli in piccol numero, affinchè divengano più grossi; sono generalmente assai voluminosi, di una figura ovata rotonda, appuntati verso l'apice, e rientrati dalla parte del peduncolo o gambetto, la di cui attaccatura resta infossata nel frutto medesimo. Sono di un giallo carico, con una buccia scabra, irregolare e quasi formata dalla riunione di molte papille umbilicate, addossate fra loro, l'umbilicatura delle quali contiene una vessichetta semidiafana ripiena d'essenza.

Il loro odore non è moltissimo, ed è una cosa di mezzo fra il Cedro ed il Limone. La buccia è molto grossa e quasi di sette o otto linee, internamente bianca ed un poco spugnosa.

La polpa interna è in conseguenza molto piccola in proporzione della grandezza del frutto; essa è fibrosa e contiene poco sugo agro non aromatico. Tagliando trasversalmente uno di questi Pomi d'Adamo cedrati, si vedono le otto o dieci divisioni che costituiscono gli spicchi interni della polpa o sostanza del frutto, tutte disposte non in linea retta, come i raggi di un cerchio e come si vedono nei cedrati, ma mezze piegate da una parte e mezze dall'altra, in